

Правила подготовки к диагностическим исследованиям.

| НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗА | УСЛОВИЯ |
|---|---|
| Общий анализ крови ОАК | Натощак , после 2 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – не менее получаса голодания. Выпить воды за 20-30 минут. Вакуумная пробирка с ЭДТА КЗ сиреневая пробка. Кровь берется из вены, в особых случаях берется из пальца (капиллярная кровь) |
| Биохимическое исследование крови | Натощак , после 12 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – не менее 2 часов голодания. Выпить воды за 20-30 минут. Берется из вены в вакуумную пробирку с зеленой пробкой. |
| Общий анализ мочи ОАМ | Собирается порция утренней мочи в чистый, сухой, одноразовый контейнер. Достаточно 20-30 мл. Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату и время сбора анализа. |
| Анализ мочи на бактериологическое исследование (бак. посев) | Собирается порция утренней мочи в стерильный разовый контейнер. Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату и время сбора анализа. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | Собирается средняя порция утренней мочи в чистый сухой одноразовый контейнер. Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату сбора анализа. ОАМ и анализ мочи по Нечипоренко собирается в разные дни. |
| Проба мочи по Зимницкому | Суточный сбор мочи. Первая порция мочи не собирается. Моча собирается каждые 3 часа. На каждой порции указать ФИО и порядковый номер порции. |
| Кал (копрологические исследования, на гельминты) | Собирать кал следует утром в чистый сухой одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой и ложечкой. Собирают материал размером с горошину и из различных мест. Можно подготовить пробу заранее, но не более чем за 12 часов перед сдачей. Хранить пробу следует в холодильнике (не замораживать). Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату и время сбора |

| | |
|--|--|
| | анализа. |
| Анализ крови на инфекционные заболевания | Особых условий нет. <i>Натошак, 2-3 часа голода. Дети до года – не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 20-30 минут.</i> Берется в вакуумную пробирку с активатором свертывания, красная пробка. |
| Анализ крови на гормоны | Натошак, после 12 часового ночного периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – не менее 1 часа голодания. <i>Выпить воды за 20-30 минут.</i> При проведении исследования на половые гормоны строго придерживайтесь рекомендаций вашего лечащего врача о дне, когда нужно сдать кровь на анализ. Берется из вены в вакуумную пробирку с активатором свертывания, красная пробка. |
| Анализ крови на гемостаз (коагулограмму) | Натошак, после 8 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 20-30 минут. Берется из вены в вакуумную пробирку с антикоагулянтом, строго до метки, синяя пробка. |
| Анализ крови на исследование методом ПЦР | Особых условий нет. Дети до года – не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 30-50 минут. |

Подготовка к УЗИ органов брюшной полости (кроме почек).

Исследование проводится натощак:

- С 1 года до 18 лет не есть, не пить 5-6 часов до исследования.
- дети до 1 года - не есть, не пить за 2 часа до исследования

При себе иметь:

- Направление от специалиста нашей поликлиники;
- Пеленку, полис.

Подготовка к УЗИ желудка.

Исследование проводится натощак (не есть, не пить 5-6 часов), для детей до 1 года - перед очередным кормлением.

При себе иметь:

- 200- 400 мл воды (негазированную) комнатной температуры;
- Направление от специалиста;
- Пеленку, полис.

Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря.

Детям с 2 лет до 18 лет за 1,5-2 часа до исследования выпить жидкости (воды):

- 2-5 лет-200-300мл.
- 6-12 лет-500 мл.

- Старше 12 лет -700мл

При себе иметь:

- Направление от специалиста нашей поликлиники;
- пеленку, полис.

Для УЗИ почек (без мочевого пузыря) подготовки не требуется.

При себе иметь:

- Направление от специалиста;
- пеленку, полис.

Проведение других видов УЗ исследований не требует подготовки